

УДК 639.2.053.3(282.247.41) (262.81)

О БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ РЕЖИМА РЫБОЛОВСТВА В ДЕЛЬТЕ И АВАНДЕЛЬТЕ ВОЛГИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОДЕЛИТЕЛЯ

А. В. ПАВЛОВ, Г. Г. СИБИРЦЕВ, А. П. СЛИВКА, Э. Г. ЯНОВСКИЙ
КаспНИРХ, ЦНИОРХ

После ввода в действие вододелителя годовой сток распределится между западной и восточной частями дельты поровну, а в период половодья по реке Бузану будет проходить $\frac{2}{3}$ стока. Главный вопрос заключается в том, смогут ли восточные рукава дельты быть миграционным путем для осетровых и других проходных рыб в обход дамбы вододелителя. Для решения этого вопроса необходимо знать, являются ли отдельные рукава дельты Волги исторически сложившимися миграционными путями или использование их рыбами зависит от водного режима, который можно регулировать. Чрезвычайно важно также определить, в какой мере действующие Правила рыболовства отвечают требованиям рационального использования запасов рыб в изменившихся условиях.

Для обеспечения оптимального воспроизводства рыб необходимо решить две задачи: сохранить условия их естественного размножения в нижнем течении и дельте Волги, пропускать на нерестилища оптимальное количество производителей каждого вида с учетом их биологической разнокачественности и улучшить маточное поголовье для размножения и искусственного разведения.

В 30-х годах, по данным В. Д. Кувшинникова, основная масса белуги мигрировала по Главному банку (67—70%) и Старой Волге (23%). На остальных банках уловы ее были незначительны и составляли около 6% общей добычи в дельте. Для хода осетра в то время основными были Главный, Никитинский банки и Старая Волга. В восточной половине дельты добывали только 15% нерестовой популяции осетра. Ход севрюги в русле дельты распределялся более равномерно. В восточных районах дельты уловы ее составляли 30% от числа зашедших в реку производителей.

В последние годы в результате падения уровня моря, уменьшения расхода воды в реке Бузан, деформации годового стока, прорытия и углубления большинства рукавов дельты в распределении хода осетровых в дельте Волги произошли существенные изменения. Два основных рукава — Старая Волга и Никитинский банк, — занимавшие ведущее место по вылову осетровых, потеряли свое значение. Существенно

снизилась интенсивность хода осетровых в Карапатском, Васильевском, Иголкинском, Карайском банках. В то же время через Главный банк теперь проходит севрюги в 3, осетра — в 1,5 раза больше, а белуги, напротив, на 30 % меньше. Кировский рукав полностью заменил Никитинский банк. При этом, несмотря на углубление большинства восточных каналов-рыбоходов, значение их для хода осетровых резко уменьшилось, и к 1969 г. улов белуги здесь составил лишь 4,1%, осетра — 6,88%, севрюги — 15,4% от их добычи в дельте Волги.

Подробный анализ многолетних материалов по распределению осетровых в русле дельты показал, что интенсивность их хода в различных рукавах определяется водностью реки. В многоводные годы и половодья значение восточных банков для хода осетровых существенно возрастает. Уменьшение расхода воды в маловодные годы и осенью ведет к снижению уловов осетровых в восточной дельте (табл. 1).

Таблица 1
Распределение уловов осетровых в восточной и западной частях дельты Волги в разные по водности годы

Сезон	Часть дельты	Маловодные годы						Средневодные годы		
		белуга		осетр		севрюга		белуга		осетр
		тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц
Весна	Западная	5,1	94,1	13,3	84,2	27,6	78,2	5,1	86,5	18,0
	Восточная	0,3	5,9	2,5	16,8	7,7	21,8	0,8	13,5	4,6
	По всей дельте	5,4	—	15,8	—	35,3	—	5,9	—	22,6
Осень	Западная	6,5	97,0	32,4	97,3	1,3	81,4	6,3	88,8	31,4
	Восточная	0,2	3,0	0,9	2,7	0,3	18,6	0,8	11,2	2,2
	По всей дельте	6,7	—	33,3	—	1,6	—	7,1	—	33,6
За год	По всей дельте	12,1	—	49,1	—	36,9	—	13,0	—	56,2
	Западная	11,6	95,9	45,7	93,1	28,9	78,3	11,4	87,7	49,4
	Восточная	0,5	4,1	3,4	6,9	8,0	21,7	1,6	12,3	6,8

Продолжение табл. 1

Сезон	Часть дельты	Средневодные годы				Многоводные годы				
		осетр		севрюга		белуга		осетр		
		%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	
Весна	Западная	79,8	24,7	75,3	5,8	74,4	18,7	74,0	23,9	72,7
	Восточная	20,2	8,1	24,7	2,1	25,6	6,6	26,0	9,0	27,3
	По всей дельте	—	32,8	—	7,9	—	25,3	—	32,9	—
Осень	Западная	93,5	1,9	82,7	8,3	88,7	17,7	88,0	1,9	74,0
	Восточная	6,5	0,4	17,3	1,0	11,3	2,1	12,0	0,5	26,0
	По всей дельте	—	2,3	—	9,3	—	19,8	—	2,4	—
За год	По всей дельте	—	35,1	—	17,2	—	45,1	—	35,3	—
	Западная	87,9	26,6	76,0	14,1	81,9	36,4	80,7	25,8	73,2
	Восточная	12,1	8,5	24,0	3,1	18,1	8,7	19,3	9,5	26,8

Примечание. Маловодные годы — 1964, 1967, 1969 — годовой сток 209 км³, за половодье — 77,6 км³; средневодные — 1963, 1965, 1968, 1971 — годовой сток 235 км³, за половодье — 105,2 км³; многоводные — 1966 и 1970 — годовой сток 286 км³, за половодье 146,3 км³.

Водность реки и внутригодовое распределение стока оказывают большое влияние и на динамику нерестового хода осетровых в Волгу. Так, в результате снижения расхода воды осенью после зарегулирования стока Волги в два с лишним раза увеличилась интенсивность ве-

сеннего хода белуги. Если в 50-х годах (Бабушкин, 1964) осенью вылавливали около 80% белуги, то в настоящее время в течение ряда лет весной добывали более 50% ее нерестовых популяций (табл. 2).

Таблица 2.

Динамика добычи белуги в Волге в весенне-осенне время

Год	Весна		Осень		За год, тыс. ц
	тыс. ц	%	тыс. ц	%	
1961	6,3	52,1	5,8	47,9	12,1
1962	7,1	46,5	8,3	53,5	15,3
1963	6,8	43,5	8,8	56,5	15,6
1964	4,0	45,5	4,8	54,5	8,8
1968	10,6	58,0	7,8	42,0	18,4
1969	8,7	55,3	7,1	44,7	15,8
1970	10,8	52,6	9,7	47,4	20,5
1971	7,1	39,8	10,7	60,2	17,8
1972	7,2	56,6	5,5	43,4	12,7

В результате задержки паводковых вод Волгоградским гидроузлом и попусков воды в межень снизилась активность хода осетра ранней весной и увеличилась численность производителей, заходящих в реку летом. В 1958—1965 гг. в апреле — мае добывали 25—30 тыс. ц осетра, а летом к местам нереста проходило 300—450 тыс. производителей. В последние годы весной добыча осетра сократилась почти наполовину, составив 17—20 тыс. ц, численность производителей, мигрирующих в летнее время, возросла до 800—1000 тыс. экз.

В целом изменение гидрографа реки и понижение температуры воды на 2—5°С (Бердичевский, 1963) в условиях зарегулированного стока привели к смещению хода всех видов осетровых к лету и, таким образом, к сокращению сроков миграции.

К сходным выводам привел нас и анализ влияния водности реки на распределение хода воблы.

Прежде чем перейти к собственным материалам, рассмотрим результаты некоторых исследований, проведенных в 30—40-х годах.


И. Н. Гольдентрахт (1932) указывал на связь солености воды с распределением воблы в море и подходов ее осенью к предуставьевой зоне, причем, отмечал, что при достижении определенной степени зрелости вобле физиологически необходима пресная вода. Распределение солености в Северном Каспии, по его мнению, зависит в основном от количества воды, приносимой в море Волгой. Чем выше весенний паводок, тем больше зона опреснения и тем обширнее зона распространения воблы. Формирование нерестовых популяций воблы начинается еще осенью. Степень зрелости половых продуктов у воблы осенью та же, что и весной, когда вобла входит в реки на нерест.

Г. А. Караваев (1939), основываясь на своих работах по мечению, констатирует, что вобла не образует обособленных и вполне локализованных групп в Северном Каспии. Перегруппировка воблы по районам и направление ее миграций обусловлены изменением окружающих условий. По данным Т. Ф. Дементьевой (1939), более крупные рыбы раньше созревают и раньше подходят к берегам.

Г. Н. Монастырский (1940), анализируя интенсивность захода воблы на нерест в разные рукава дельты, пришел к выводу, что более мощный ход воблы по западным и восточным протокам не случаен и теснейшим образом связан с высотой весеннего половодья предшест-

вующего года. Он считает, что на основании указанной зависимости можно с достаточной степенью достоверности заранее судить о распределении мощности хода воблы в западной и восточной частях дельты Волги.

Закономерности распределения воблы в зависимости от солености воды подтверждаются и нашими материалами. Сопоставление осенних уловов воблы на одно траление исследовательским судном в Северном Каспии с соленостью воды выявляет довольно тесную связь: в более



Зависимость средних уловов воблы от солености воды в западном и восточном районах Северного Каспия на глубинах до 4 м (октябрь):

1 — соленость воды, %/oo; 2 — улов воблы на одно траление, %.

опресненных районах моря концентрация воблы выше (см. рисунок). Совершенно ясно, что при перераспределении речного стока произойдет опреснение восточной части Северного Каспия, поскольку его соленость в значительной степени зависит от объема весеннего половодья Волги (Катунин, Кузьмин, Осадчих, Лексуткин, 1971). Увеличение притока воды по восточным рукавам вызовет повышение осенних концентраций полупроходных рыб в этом районе предустьевой зоны, следовательно, увеличится заход производителей весной на нерест, поэтому «Временными правилами эксплуатации вододелителя» предусмотрен повышенный осенний расход воды в восточной части дельты.

Учитывая, что с вводом в эксплуатацию вододелителя оптимальные условия для естественного размножения полупроходных рыб будут созданы только в восточной части дельты, рыболовство здесь следовало бы полностью запретить. Какие имеются к этому основания? По данным А. Ф. Коблицкой (1970, 1971), распределение полупроходных рыб на нерестилищах в разных зонах дельты неравномерно. Большее количество производителей воблы, леща и судака заходит на нерест в западную половину дельты, поэтому продуктивность нерестилищ (численность приплода) здесь выше, чем в восточной части. Если количество молоди воблы на одну пробу на западе дельты равняется в среднем 120,1 экз., то на востоке — 97,5; по лещу соответственно: 30,4 и 7,6; по судаку — 10,3 и 6,3 экз.

По нашим данным на более продолжительный период наблюдений (с 1959 по 1973 г.) продуктивность нерестилищ западной половины дельты также значительно выше, чем восточной. Так, средний улов сеголетков на 1 ч траления в июле в Северном Каспии в районах, при-

легающих к западной части дельты, составлял; воблы 288, леща 16,7 и судака 2,2 экз. В районах, прилегающих к восточной половине дельты, эти показатели соответственно составляли: 125; 4,4 и 0,6.

Снижение продуктивности восточных нерестилищ объясняется ухудшением водности реки и уменьшением численности производителей. Зарегулирование стока Волги привело к сокращению объема весеннего половодья и, следовательно, к ухудшению проходимости рыбоходных каналов в восточной половине дельты, что подтверждается данными табл. 3.

Таблица 3
Средние уловы сеголетков на 1 час траления

Периоды	Уловы	Западная половина		Восточная половина	
		лещ	судак	лещ	судак
До зарегулирования стока (1954—1958 гг.)	экз.	35,74	4,36	33,06	3,12
	%	51,66	58,30	48,34	41,70
После зарегулирования стока (1959—1973 гг.)	экз.	16,7	2,15	4,37	0,57
	%	79,3	79,0	20,7	21,0

Таким образом, в настоящее время численность приплода находится в прямой зависимости от количества производителей.

В восточной половине дельты количество производителей полупроходных рыб значительно меньше, чем в западной. Осуществляя интенсивный промысел на современном уровне, нельзя рассчитывать на то, что эффективность размножения рыб повысится только в результате улучшения условий нереста. Необходимо существенно увеличить количество производителей, пропускаемых к местам размножения, а этого можно достичнуть запрещением рыболовства в восточной половине дельты Волги.

Как показывает современное распределение промысловых рыб, в восточной части дельты обитает свыше 50% хищных (сом, щука) и малоценных частиковых рыб (красноперка, густера, уклейя, окунь) (табл. 4).

Таблица 4
Распределение промысловых рыб в западной и восточной частях дельты Волги (в %)

Рыба	Западная часть дельты					Восточная часть дельты				
	1966	1967	1968	1969	1970	1966	1967	1968	1969	1970
Вобла	69,6	60,2	60,7	6,9	62,7	30,4	39,8	40,0	38,1	37,3
Лещ	62,3	6,3	57,7	64,2	63,2	37,7	35,7	42,3	35,8	36,8
Судак	78,3	72,3	59,2	71,2	66,4	21,7	27,7	40,8	28,8	33,6
Сазан	26,1	31,3	42,4	43,0	58,6	73,9	68,7	57,6	57,0	41,4
Сом	35,8	33,6	37,7	43,0	41,9	64,2	66,4	62,3	57,0	55,1
Щука	15,0	34,2	36,9	39,2	31,0	85,0	65,8	63,1	60,8	69,0
Мелкий частик	47,7	41,0	44,7	48,0	44,7	52,3	59,0	55,6	52,0	55,3

Запасы хищных и малоценных видов рыб находятся в удовлетворительном состоянии и, конечно, их следует использовать. В связи с этим мы рекомендуем осенний отлов хищных и сорных рыб орудиями ловушечного типа (секрета, вентеря) с 1 августа до 15 октября.

Особенностью современного рыболовства в дельте Волги является применение мелкоячейных орудий лова только в период массового хо-

да воблы — с 1 по 30 апреля. С начала распаления льда до 1 апреля и с 1 по 25 мая могут применяться редкочайные орудия лова, рассчитанные на вылов крупночастиковых рыб.

Таким образом, промысел воблы осуществляется только в течение апреля.

Недостатком современного промысла в дельте Волги является то, что основная его тяжесть ложится на весну. В мае (особенно во второй половине) вылавливаются либо производители с половыми продуктами, близкими к стадии нереста, либо отнерестившиеся, покатные особи. Большой ущерб запасам леща и сазана наносит массовое применение секретов (до 200 тыс. шт.), устанавливаемых обычно в небольших протоках на подступах к нерестилищам. Этим способом в мае вылавливается 140—170 тыс. ц леща. Промысел рыбы в мае, с одной стороны, наносит серьезный ущерб естественному воспроизводству, с другой,— не выгоден для промышленности, поскольку всецело основан на вылове рыбы весьма низкого товарного качества.

Мы рекомендуем перенести центр тяжести промысла с весенне-летнего периода на осенний. Подобная перестройка соответствует принципам рационального ведения промысла для южных районов (Никольский, 1965).

О том, что осенью товарные качества рыб выше, чем весной, свидетельствуют данные, полученные И. Я. Клейменовым (1971) при изучении жирности и калорийности пищи полупроходных рыб Волго-Каспийского района в различные сезоны года (табл. 5).

Таблица 5
Качество мяса рыб весной и осенью

Рыба	Жирность, % к общему весу		Калорийность 100 г мяса, ккал	
	вода	осень	весна	осень
Лещ	2,5	3,2	91—95	91—105
Вобла	1,1	3,3	84—86	106—109
Судак	0,4	0,7	80—82	84

Заметим, что разница в жирности и калорийности рыб была бы еще больше, если бы автор сопоставлял данные только за май и октябрь, а не за всю весеннюю и осеннюю путину.

Перенос промысла на осень выгоден еще и тем, что температура воды и воздуха осенью ниже, поэтому сортность рыбы будет выше. Кроме того, за период откорма (июнь — август) рыба даст дополнительный прирост веса, что приведет к повышению общих уловов. Так, по нашим расчетам, средний вес места одного возраста осенью на 20—30% больше, чем весной. По одному только виду (лещу) это приведет к увеличению уловов на 30—35 тыс. ц.

Осенняя путина в дельте Волги сейчас разрешена с 1 августа до ледостава. Между тем исследования показывают, что август — месяц интенсивного откорма и роста рыб. К тому же в августе еще очень высокая температура воды и воздуха, что способствует быстрой порче вылавливаемой рыбы и снижению ее сортности.

Учитывая это, начало осенней путиной в дельте целесообразно перенести с 1 августа на 1 сентября. Осеннюю путину следует разрешить только в западной половине дельты, а в восточной запретить, чтобы предотвратить преждевременный вылов производителей и создать условия для накопления рыб в этой части дельты.

Мы рекомендуем сократить продолжительность промысла вобельными орудиями лова и вести его с распаления льда до 10 мая в западной зоне дельты Волги и с 10 апреля до 5 мая — в восточной. Целесообразность прекращения промысла в первой декаде апреля обосновывается, во-первых, необходимостью ограждения от вылова заходящего в дельту судака, численность нерестовой популяции которого исключительно низкая, и, во-вторых, необходимостью пропуска на нерест более крупных и полноценных производителей воблы и осетровых. В целях компенсации недолова рыбы в мае мы рекомендуем разрешить лимитированный лов в авандельте Волги осенью. Это позволит промышленности использовать ту часть обособленной локальной нерестовой популяции леща и сазана, которая размножается в авандельте, а в дельту вообще не заходит и таким образом остается вне сферы промысла. При отлове хищных и малоценных рыб целесообразно разрешить принимать весь прилов леща, сазана и судака. Но органы рыбоохраны должны определять районы лова, исходя из мест концентрации хищных и малоценных видов рыб.

В новом режиме рыболовства предусмотрено запрещение зимнего подледного лова в восточной половине дельты и авандельты. Это запрещение необходимо для того, чтобы оградить от преждевременного вылова производителей полупроходных рыб.

Внесены конструктивные предложения и в режим рыболовства на Северном Каспии. Для свободного прохода производителей полупроходных рыб на нерестилища весеннюю путину в море, в районах против восточной зоны дельты, следует запретить, осенью — разрешить с 1 сентября до 1 октября. Для соблюдения предлагаемых сроков запрета рыболовства необходимо исключить из Правил рыболовства примечание к пункту «э» статьи 9 о предоставлении органам рыбоохраны права изменять сроки запрета лова рыбы.

Мы предлагаем промысел в море орудиями ловушечного типа в весеннюю путину прекращать не с 1 июня, как предусмотрено Правилами рыболовства, а с 1 мая. Необходимость этого определяется тем, что в настоящее время в связи с застанием дельты, продвижением растительности на 38—50 км в море нерестилища полупроходных рыб сместились в низовья Волги, в авандельту (Коблицкая, 1970, 1971; Горбунов, Коблицкая, Косова, 1965). Значение авандельты как места размножения полупроходных рыб (леща, сазана и др.) существенно возросло. Нерест в этом районе зависит в основном от прогрева воды, так как островная зона всегда залита независимо от сроков и объема половодья. Нерест рыб в предустьевой зоне начинается в среднем на 10—12 дней раньше, чем на полоях в дельте. Нерест леща здесь начинается, как правило, в конце апреля (28 апреля), а на полоах — 9 мая. В связи с этим в мае отлавливаются в основном отнерестившиеся или готовые к нересту производители леща.

В ходе эксплуатации вододелителя необходимо провести наблюдения за распределением полупроходных рыб по акватории дельты. Это позволит своевременно внести соответствующие корректизы в режим рыболовства.

Таким образом, все сказанное дает основание считать, что опреснение восточных районов Северного Каспия при эксплуатации вододелителя должно значительно повысить концентрацию проходных и полупроходных рыб в этой части моря, а также способствовать более интенсивному заходу производителей в восточные банки в весеннеое время. Не исключено, что большие полуски воды по Бузану могут привлечь в Волгу часть уральских рыб, в особенности севрюгу.

Зарегулирование стока Волги существенно сократило нерестовый ареал проходных и полупроходных рыб и снизило эффективность их размножения на оставшихся нерестилищах в дельте и Нижней Волге. Если раньше воспроизводство осетровых различных сроков хода не имело существенных отличий, то в условиях зарегулированного стока эффективность нереста весенних форм оказалась выше, поскольку они осваивают нижние нерестовые гряды, нерестятся в год захода в реку, а также имеют более высокие размерно-весовые показатели и плодовитость. Несмотря на это, при современных сроках запрета охраняется лишь незначительная доля севрюги в июне и необоснованно не используются запасы осетра летнего хода. Вся остальная, наиболее важная для воспроизводства часть нерестовых популяций подвергается интенсивному промысловому изъятию — вылавливается около 90% заходящих в реку производителей. Существующие ныне Правила рыболовства, несмотря на неоднократные их изменения (8 раз за текущее столетие), недоучитывают важнейшие черты биологии осетровых: динамику нерестового их хода, качественный состав и воспроизводительную способность. Установленные в 40-х годах сроки рыболовства практически остались прежними, в то время как в условиях зарегулированного стока Волги динамика нерестового хода осетровых существенно изменилась.

При рациональном ведении осетрового хозяйства к местам нереста необходимо пропускать не менее 40% нерестовой популяции (Никольский, 1965; Макаров, 1970). Пропуск производителей должен осуществляться в течение всего периода их миграции в реки в соответствии с адаптацией популяций к условиям размножения. При современном уровне запасов ежегодно на места размножения следует пропускать 600—700 тыс. экз. осетровых, в том числе в весеннее время — 180—220 тыс. экз. Между тем при существующем режиме рыболовства в весеннее время на нерест в среднем пропускается только 70—75 тыс. производителей.

Выводы

Приведенные данные говорят о том, что современный режим рыболовства не соответствует в полной мере ни нуждам естественного воспроизводства рыб, ни рациональному использованию их запасов. В созавшихся условиях необходима коренная перестройка промысла, суть которой сводится к изменению режима рыболовства в Волго-Каспийском районе. Особую важность приобретает эта проблема с введением в действие вододелителя.

Преграждение плотиной вододелителя коренного русла Волги, представляющего собой основной миграционный путь большинства ценных промысловых видов рыб, затруднит доступ на нерестилище большей части производителей. Свободный проход их на места размножения возможен весной лишь через восточные рукава дельты.

Контингент осетровых, мигрирующих по рукавам восточной дельты, даже при активизации их хода до уровня средневодных лет при больших попусках воды по Бузану, не обеспечит оптимальной численности производителей для нереста и сохранения многовозрастной структуры популяций. Чтобы пропустить на места размножения 35—40% нерестовых популяций, необходимо снизить интенсивность промысла осетровых в западной части дельты. Учитывая, что поздней осенью и ранней весной мигрируют наиболее крупные осетры, характеризующиеся высокой

плодовитостью, снижение интенсивности промысла необходимо именно в эти сроки. Уменьшить интенсивность промысла в западной части дельты можно путем сокращения промысловой зоны (концентрация неводного рыболовства) до 6—8 тоней на каждом рукаве или прекращением неводного и сетного промысла в русловой части Главного или Кировского банка.

В качестве компенсации недолова осетровых необходимо разрешить лов красноловными неводами на Главном и Кировском банках на 18 тонях. Из их числа на 6—8 тонях с 20 мая по 15 июля следует производить лов сельди вобельными неводами. Изъятие 60% нерестовой популяции летнего осетра, запас которого составляет около 800—1000 тыс. шт., вполне компенсирует возможный их недолов. В первые два года после введения в действие вододелителя целесообразно сохранить лимитирование уловов. Расширение промысла летнего осетра вызывает необходимость перераспределить лимит с весны и осени на лето.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабушкин Н. Я. Биология и промысел каспийской белуги. — «Труды ВНИРО», 1964, т. 52, с. 183—258.
- Бердичевский Л. С. Регулирование промысла осетровых и его биологические основы. — В кн.: Осетровое хозяйство в водоемах СССР. М., 1963, с. 19.
- Гольдентрахт И. Н. К изучению природы осенних миграций воблы Северного Каспия и факторов их обусловливающих. — «Бюллетень Всекаспийской рыбохозяйственной экспедиции», 1932, № 3—4, с. 43—57.
- Горбунов К. В., Коблицкая А. Ф., Косова А. А. Значение авандельты Волги для воспроизводства полупроходных рыб. — «Труды Астраханского заповедника», 1965, вып. 10, с. 375—438.
- Дементьев Т. Ф. Распределение и миграции воблы в море. — «Труды ВНИРО», 1939, т. 10, с. 81—124.
- Карааев Г. А. Миграции воблы в Северном Каспии. — «Труды ВНИРО», 1939, т. 10, с. 33—80.
- Клейменов И. Я. Пищевая ценность рыбы. М., «Пищевая промышленность», 1971, 78 с.
- Коблицкая А. Ф. Особенности биологии молоди рыб в западной и восточной частях низовьев дельты Волги. — «Труды Астраханского заповедника», 1970, вып. 13, с. 260.
- Коблицкая А. Ф. Естественное размножение рыб в дельте Волги в условиях зарегулированного стока. — В кн.: Проблемы изучения и рационального использования водоемов. Куйбышев, 1971, 293 с.
- Макаров Э. В. К оценке естественной смертности азовских осетровых. — «Труды ЦНИОРХа», 1970, т. 2, с. 90—94.
- Монастырский Г. Н. Нерестовый ход в реки, размножение и скат воблы. — «Труды ВНИРО», 1940, т. 2, ч. 2, с. 25—45.
- Никольский Г. В. Теория динамики стада рыб. М., «Наука», 1965. 325 с.
- Оптимальный режим работы вододелителя в дельте Волги и схема организации рыболовства в условиях его эксплуатации. — «Труды КаспНИРХа», 1971, т. 26, с. 7—33. Авт.: Д. Н. Катунин, А. Г. Кузьмин, В. Ф. Осадчих, А. Ф. Лексуткин.

SUMMARY

Based on the long-term analysis of the materials, the significance is shown of separate areas of the Volga delta for the run of sturgeons and reproduction of semi-anadromous fishes. Data on changes in the distribution of fishes in various areas of the delta as related to the amount of water in the river and its separate arms are presented. Measures are outlined on changing fishery regime under conditions of redistribution of the river flow between the west and east with the help of the water divider.

Particular attention is given to sturgeons, rational fisheries for them, and a rise in the efficiency of their natural reproduction in the new ecological environment.

РЕФЕРАТЫ

УДК 639.2.053(262.81)

Пути сохранения высокой рыбопродуктивности Каспийского моря. Бердичевский Л. С. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 6—17.

Освещается современное состояние проблемы продуктивности Каспийского моря. Даётся краткая характеристика изменений, которые произошли в водоеме под влиянием природных факторов и деятельности человека. Приводятся результаты научных исследований, направленных на решение возникших перед рыбным хозяйством проблем по воспроизводству запасов, укреплению кормовой базы и регулированию численности промысловых рыб. Предлагаются научно обоснованные рекомендации по сохранению высокой рыбопродуктивности Каспийского моря.

Табл. 3.

УДК 551.482.243.4 : 551.465.5(262.81)

Современный и перспективный водный и солевой баланс и возможные изменения гидрологического режима Каспийского моря. Архипова Е. Г. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 18—26.

Приводятся основные результаты расчета современного и будущего водного и солевого балансов Каспийского моря и отдельных его районов с учетом возможных климатических изменений и различных вариантов естественного стока рек, безвозвратного изъятия, переброски части стока северных рек и сокращения стока в залив Карабогаз-Гол.

Рассмотрены различные варианты регулирования режима моря.

Табл. 3, илл. 4, список литературы — 4 названия.

УДК 551.464.5 + 626.88(262.81)

Изменение режима солености Северного Каспия после зарегулирования волжского стока. Катунин Д. Н. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 27—32.

Рассмотрено изменение режима солености Северного Каспия после зарегулирования волжского стока. Увеличение солености воды, сокращение площади опресненных зон, сглаживание вертикальных градиентов солености неблагоприятны для слабосолоноватоводной (реликтовой) группы гидробионтов, а также полуходовых рыб. При сокращении притока в море речных вод соленость Северного Каспия будет возрастать.

Список литературы — 5 названий.

УДК 626.88 + 577.472(282.247.4)

Влияние зарегулирования стока реки Волги на биосток и биологические процессы в ее дельте. Горбунов К. В. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 33—43.

Приведены результаты многолетнего изучения микробиологии и гидробиологии водоемов дельты Волги. Оценивается первичная продукция и продуктивность микробных процессов в водоемах разных зон дельты. Анализ роли аллохтонного органического вещества приводит к необходимости рассматривать всю систему водоемов Волго-Ахтубинской поймы, дельты Волги, авандельты и Северного Каспия как единый биом, связь отдельных частей которого обуславливает биологическую и промысловую продуктивность всего Волго-Каспийского района.

Табл. 5, список литературы — 10 названий.

УДК 551.482(282.247.41)

К геоморфологии дельты Волги. Буданов В. И. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 44—49.

В настоящее время для развития дельты Волги характерны смещение стока из восточных рукавов в западные, замедление роста и выдвижения морского края дельты, сокращение площадей заливаемых в паводок полоев и возрастание роли авандельты для нереста и нагула рыб. В случае падения уровня Каспия авандельта перестанет существовать. Для формирования новой авандельты потребуется не один десяток лет. В целях мелиорации дельты для сохранения ее рыбных богатств проектируется ряд мероприятий, направленных на поддержание уровня моря, сохранение оптимального солового режима в Северном Каспии и обводнение восточной части дельты.

Список литературы — 5 названий.

УДК 577.473/474(262.81)

Многолетние изменения биомассы разных трофических групп бентоса Северного Каспия. Яблонская Е. А. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 50—64.

Районы массового развития донных организмов разных экологических групп охарактеризованы по содержанию взвеси и органического вещества в воде и грунте. Проведены многолетние изменения биомассы отдельных трофических групп донного населения и рассмотрено влияние обеспеченности пищей на величину биомассы донных организмов.

Илл. 16, список литературы — 15 названий.

УДК 577.473/474(262.81)

Годовые и сезонные изменения биомассы бентоса западной части Среднего Каспия. Алигаджиев Г. А. Труды ВНИРО, т. CVIII. «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 65—74.

Анализ сезонной и годовой динамики бентоса в западной части Среднего Каспия показывает, что биомасса отдельных видов и групп донного населения возрастает от весны к лету. В прибрежных районах, где концентрация рыб сравнительно велика, высокопродуктивные пятна организмов к концу лета уменьшаются, а в недоступных для бентофагов участках дна возрастают. Выявлено неполное использование рыбами отдельных представителей бентоса и интенсивное выедание нереид и абры.

Табл. 7, илл. 3, список литературы — 16 названий.

УДК 581.526.323(262.81)

Фитобентос Красноводского залива. Блинова Е. И., Филиппов Г. М. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 75—80.

В Красноводском заливе обнаружено 18 видов макрофитов: 9 видов зеленых водорослей, 6 видов багрянок и 3 вида высших водных растений. Описано распределение растений в зависимости от глубины и грунта. По ориентировочным подсчетам общая биомасса (запас) фитобентоса Красноводского залива в июле составляет 100—150 тыс. т сырого вещества.

Табл. 1, илл. 1, список литературы — 5 названий.

УДК 597—153(262.81)

Кормовая база рыб Каспийского моря. Яблонская Е. А., Осадчих В. Ф., Винецкая Н. И., Левшакова В. Д., Курашова Е. К. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 81—98.

В статье рассматриваются многолетние изменения биомассы организмов фитопланктона, зоопланктона и бентоса Каспийского моря в связи с колебаниями гидрологических и трофических условий обитания гидробионтов. Даётся оценка современного состояния кормовой базы основных промысловых рыб Каспия и намечаются основные направления дальнейших исследований биологической продуктивности Каспийского моря.

Табл. 12, илл. 4, список литературы — 21 название.

УДК 639.212+639.2.053.8(262.81)

Современное состояние численности осетровых в Северном Каспии. Захаров С. С. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 99—108.

Рассматриваются изменения, произошедшие в размерно-возрастной структуре осетровых после зарегулирования Волги. Особое внимание уделяется оценке плотности

запаса молоди в Северном Каспии по траловым и дрифтерным ловам промысловой разведки. Сделана попытка определить численность рыб, нагуливающихся в летний период на морских пастбищах Северного Каспия. Общая численность в водоеме взрослых осетровых в настоящее время остается сравнительно высокой и резкого уменьшения уловов в ближайшие 10—15 лет не предвидится.

Табл. 6, илл. 2, список литературы — 13 названий.

УДК 597.442

О биологических особенностях каспийских осетровых и их использовании в практике осетрового хозяйства. Шубина Т. Н. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 109—120.

Биологические свойства осетровых — многогранная экологическая приспособленность, широкий спектр питания, высокий темп роста, большая плодовитость, низкая естественная смертность молоди и т. д. — определяют величину пополнения популяций. Их необходимо учитывать при оценке значения отдельных видов осетровых в управляемом хозяйстве. Каждое конкретное мероприятие, планируемое в осетровом хозяйстве, должно соответствовать природным возможностям видов осетровых. Современное состояние запасов осетровых вполне удовлетворительно, но не соответствует кормовой базе, которая недопользовывается. Масштабы воспроизводства отдельных видов осетровых должны определяться их кормовой обеспеченностью. Увеличение популяций осетровых в будущем приведет к лучшему использованию кормовых возможностей Каспийского моря.

Табл. 1, илл. 1, список литературы — 45 названий.

УДК 639.212—639.2.053(262.81)

Заласы каспийских осетровых и их использование в современных условиях. Легеза М. И. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 121—134.

Исследовали динамику уловов, начиная с 30-х годов, видовой состав траловых и неводных ловов и те изменения, которые имели место в последние годы. Предпринята первая попытка установить абсолютную численность осетра и севрюги методом площадей по материалам траловых съемок за июнь — июль и июль — август 1968—1970 гг. с учетом данных Промразведки КаспНИРХа из мелководной зоны Северного Каспия за те же сроки.

Табл. 7, список литературы — 34 названия.

УДК 639.222+639.2.053(262.81)

Сельди Каспийского моря, современное состояние их запасов и перспективы. Канчееев Е. Н. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 135—143.

Дана характеристика современного состояния запасов каспийских сельдей. Сокращение водности бассейна, снижение уровня моря, зарегулирование волжского стока, загрязнение промысловых зон — основные факторы, определяющие современную низкую численность сельдей. При дальнейшем снижении уровня моря запасы каспийских сельдей так же, как и других промысловых рыб, будут заметно уменьшаться.

Табл. 3, список литературы — 14 названий.

УДК 597.553.1+597—152.6(262.81)

Кильки Каспийского моря и их численность. Приходько Б. И. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 144—153.

Приводятся данные о биологии трех видов каспийских кильек, развитии их промысла и соотношении разных видов в уловах. Описана методика оценки состояния запаса анчоусовидной кильки. Рассматриваются изменения запаса и возрастного состава стада анчоусовидной кильки на протяжении последних девяти лет. Предлагается регулирование добычи кильек.

Табл. 4, илл. 1, список литературы — 15 названий.

УДК 639.222+639.2.053.8(262.81)

Причины колебания запасов анчоусовидной кильки. Дементьев Т. Ф., Приходько Б. И. Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 154—158.

На основании многолетних данных рассматриваются закономерности динамики численности анчоусовидной кильки. Установлена положительная связь между колебаниями запаса, численности поколений и биомассы планктона. Показателем изменений биомассы планктона приняты изменения температуры воздуха в январе — апреле, т. е. за период, предшествующий появлению нового поколения кильки. Полученные результаты могут быть использованы в прогностических целях.

Илл. 2, список литературы — 4 названия.

Современное состояние запасов рыб бассейна р. Куры. Абдурахманов Ю. А.
Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975,
с. 159—163.

Приведены новые данные об эффективности икрометания рыб на сохранившихся
естественных нерестилищах в р. Куре. Выявлены причины низкой рыбопродуктивно-
сти Мингечеурского водохранилища и указаны мероприятия для ее повышения.
Установлено, что в Азербайджане имеются все возможности для развития прудового
хозяйства, однако необходимые для этого мероприятия осуществляются медленно.

Список литературы — 3 названия.

УДК 639.2.053(262.81)

Современное состояние запасов промысловых рыб Юго-Восточного Каспия.
Попова А. А., Богородицкий П. В., Гусева Т. В., Бердыев Б. Р. Труды ВНИРО,
т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 164—172.

Анализ динамики промысловых уловов за 1931—1973 гг. показал, что в Туркмен-
ских водах Каспия общий подъем добычи вызван увеличением вылова малоценных
видов, вылов ценных рыб резко сократился. Установлено, что запасы воблы, сазана,
морского судака снизились под влиянием ряда природных и антропогенных факторов.
Современное состояние запасов большинства ценных видов крайне неудовлетвори-
тельно. Оно может быть улучшено и уловы увеличены путем оптимизации условий
естественного воспроизводства воблы и сазана, заводского воспроизводства морского
судака; совершенствования и интенсификации промысла кефалей.

Табл. 4, илл. 2, список литературы — 5 названий.

УДК 595.384.16+639.28(282.247.41) (262.81)

Биология и состояние запасов речных раков Волго-Каспия. Румянцев В. Д.
Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975,
с. 173—176.

Приводятся данные по биологии и распределению речных раков. По расчетам
автора, запасы раков в водоемах Волго-Каспия велики и могут обеспечить ежегод-
ную добычу свыше 500 ц в Волго-Ахтубинской пойме, 1,5 тыс. ц в дельте Волги,
в целом по морю — не менее 3,0 тыс. ц. При снижении уровня моря на 1 м и более
численность раков Волго-Каспия сократится на 35—40%.

Список литературы — 3 названия.

УДК 595.361.39+639.28(262.81)

**Распределение и запасы раков рода *Astacus* (Crustacea, Decapoda, Astacidae) в
Туркменских водах Каспия. Черкашина Н. Я.** Труды ВНИРО, т. CVIII «Биологиче-
ская продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 177—184.

В Туркменских водах Каспия обитают два вида раков — длиннопалый и толсто-
палый. Наиболее плотные скопления длиннопалого рака обнаружены в районе Кайли-
Кубасенгир (Красноводский залив), в восточной части Туркменского залива и в от-
крытой части моря — севернее пролива Кара-Богаз-Гол, Бекдаш, толстопалого — в
районах Куули-Маяк, Джрафа. Высокая численность длиннопалого рака наблюда-
ется один раз в три года, толстопалого — один раз в четыре года. Уловы можно уве-
личить путем интенсификации промысла в Красноводском заливе и расширения про-
мысла в открытой части моря и в Туркменском заливе.

Табл. 1, илл. 4, список литературы — 19 названий.

УДК 639.247.4(262.81)

**Состояние запасов каспийского тюленя и перспективы их использования. Румян-
цев В. Д., Ворожцов Г. А., Хураськин Л. С., Юсупов М. К.** Труды ВНИРО, т. CVIII
«Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1975, с. 185—189.

Описаны краткая история промысла, современное состояние запасов и мероприя-
тия по регулированию добычи каспийского тюленя. Отмечается ухудшение условий
существования популяции тюленя по сравнению с 30-ми годами. На основании при-
ближенных расчетов делается попытка прогнозирования численности и добычи тюленя
на 1990—2000 гг. в условиях возможного изменения уровня Каспия.

Список литературы — 5 названий.