

ОТРЯД GASTEROSTEIFORMES. — КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ

Плавательный пузырь замкнут (не соединен с кишечником). Перед спинным плавником имеется несколько колючек. Брюшные плавники приближены к грудным. Верхняя челюсть окаймляется только межчелюстными костями.

В Каспийском море обитает только один вид *Pungilius platygaster* (Kessler) — малая южная колюшка, относящаяся к семейству Gasterosteidae.

Pungilius platygaster (Kessler) — малая южная колюшка (рис. 35). Тело веретенообразной формы, покрытое не чешуей, а малозаметными костными пластинками. Неветвистые лучи спинного плавника представляют собой отдельно посаженные колючки, направленные в разные стороны (VIII—XI). В брюшных и анальном плавниках имеется по одной колючке; брюшные колючки — с мелкими зубчиками.




Рис. 35. *Pungilius platygaster* (Kessler) — малая южная колюшка

Встречается повсеместно в низовьях Волги, Урала, Терека, Куры и других рек, реже в прибрежных частях моря. Держится преимущественно в неглубоких стоячих и полустоячих водоемах.

Рыба небольшая, длиной 35—60 мм. Переселяется в дельте Волги с конца января до середины июня, в водоемах Азербайджана в апреле. Икротанки порционные. Самцы устраивают из растительности «гнезда», куда загоняют зрелых самок для откладывания икры и затем охраняют оплодотворенную икру. Плодовитость невелика — от 300 до 550 икринок.

Колюшка — хищник, пожирающий личинки и икринки рыб.

Промыслового значения не имеет.