

ОТРЯД ANGUILLIFORMES — УГРЕОБРАЗНЫЕ

Тело удлиненное, змеевидное. Спинной и анальный плавники длинные и в хвостовой части тела обычно сливаются. Нет мезоракома. Наружные жаберные щели узкие.

Отряд включает много семейств яиц неключительно морских рыб. Только немногие заходят в реки, где откармливаются несколько лет до наступления половой зрелости, а затем уходят в море.

111

У берегов Европы обитает один вид *Anguilla anguilla* (Линн) из семейства Anguillidae, проникший в бассейн Каспия из Балтийского моря по каналам.

Anguilla anguilla (Linné) — речной угорь. Тело удлиненное, цилиндрическое, сжатое с боков в задней части. Голова коническая, приподнята. Чешуя мелкая. Глаза маленькие. Боковая линия хорошо выражена. Позвонков 101—119.

В низовьях Волги встречается редко, в единичных экземплярах, однако в последние время поимки угря в дельте заметно увеличились. Начиная с 1964 г. зарегистрированы поимки нескольких особей угря в морских водах Азербайджана (Мазий Кызылагачский залив) и в р. Куре в 60 км от устья. По-видимому, более частые случаи поимки угря связаны с заселением бассейна Волги личинками этой рыбы.

При наступлении половой зрелости покидают пресные воды и уходят в море. Нересты угря находятся вдали от европейских берегов, в западной части Атлантического океана. После икрометания угри отбывают. Выклюнувшиеся из икры личинки течением переносятся в течение трех лет к берегам Европы, откуда в виде сформировавшихся молодых угрей мигрируют в реки. Речной период жизни угря — 6—8 лет.